

# 営農技術情報（第2号）～JA富山市米品質向上生産運動展開中～

＜目指せ！うるち玄米1等米比率90%以上！！＞

コシヒカリの田植えは5/15を中心に行いましょう！

- 育苗ハウスの換気を徹底し、活力の高い苗に仕上げましょう。
- 基肥量は、土壌条件に応じて調整しましょう。
- 代かき後の雑草の発生が早くなっています。除草剤は遅れずに適正量を散布しましょう。

## 1. 硬化期の育苗管理

### 【温度管理】

○ハウス内温度は、25℃以下となるよう換気を徹底しましょう。

晴天日だけでなく、曇りの日でも日差しがあればハウス内温度はかなり上昇するので早めに換気を始めましょう。

○田植1週間前からは、夜間もハウスを開けましょう。ただし、夜間の気温が5℃以下となるのが予想される場合は、ハウスを早めに閉めて保温に努めましょう。

### 【水管理】

○かん水は、床土の乾きに応じ、的確に行いましょう。

### 硬化期の温度管理の目安

	温度
昼	25℃以下
夜	10℃以上

## 2. 本田準備

○代かきは、田植予定日の3～5日前に実施しましょう。

○代かきは少なめの水で行い、稲わらや雑草等をすき込みましょう。また、代かき後は自然減水とし、濁り水をほ場外に流さないようにしましょう。

## 3. 田 植 え

○栽植密度70株/坪、植付本数3～4本、植付深さ3cm程度となるように田植機を調整しましょう。

### 【基肥量】

○基肥量は、土壌に応じた施肥基準を遵守しましょう。

○施肥量は、田植機や肥料、ほ場の条件等により異なります。田植時に落下量を確認し、必要に応じて再度調整しましょう。

### ＜肥効調節型（一発）＞

品種名	肥料名	基肥量(kg/10a)		
		砂質浅耕田	砂壤土乾田	壤土乾田
コシヒカリ	Jコートコシヒカリ1号	35	30	25
	けい酸加里入り Jコートコシヒカリ1号	45	40	35
てんたかく81	LPs 早生専用		43	40
てんこもり	LPss 晩生専用			
ゆうだい21	ゆうだい21専用	40	35	30

### ＜分 施＞

品種名	肥料名	基肥量(kg/10a)		
		砂質浅耕田	砂壤土乾田	壤土乾田
コシヒカリ	基肥206	35	30	25
てんたかく81		45	40	35
てんこもり				

