


# 大麦特報 第3号

令和4年4月  
富山市農業協同組合  
富山農林振興センター

本年は、大雪の影響で昨年より生育が遅く、止葉展開期は4月9日～11日頃、出穂期は**4月20日～22日頃**となる見込みです(10月上旬播種)。  
ほ場ごとに生育状況を確認し、**赤かび病防除**を必ず行ってください。

## 排水対策

排水不良のほ場では、根張りが悪く、登熟が悪くなります。ほ場を確認し、排水溝の手直しと排水口への連結など排水対策を徹底しましょう。



## 赤かび病の防除

- 赤かび粒の**混入限度は0.0%**と厳しく定められています。
- 赤かび病防除は、ほ場ごとの**出穂状況を確認**し、最も効果的である**穂揃期(開花始め)とその7日後の2回防除**を必ず行ってください。

### 【防除体系及び農薬名】

防除時期	1回目: 穂揃期: 開花始め(出穂から3～5日目頃)	+	2回目: 1回目散布の7日後
粉剤体系	トップジンM粉剤DL (4kg/10a)		ワークアップ粉剤DL (3kg/10a)
液剤体系	トップジンM水和剤 (1500倍 150 $\frac{L}{10a}$ )		ワークアップフロアブル (2000倍 150 $\frac{L}{10a}$ )

## カラスノエンドウ等の除去

- 実需者から、異物混入防止の徹底を求められており、特に、カラスノエンドウ等の種子の混入防止が重要です。
- ほ場内に侵入してからの除去は労力を要するため、ほ場周辺で**カラスノエンドウやハマダイコンを見かけたら速やかに除去**しましょう。



写真 カラスノエンドウ

**令和4年春の農作業安全運動**  
4月1日～5月31日  
「しめよう！シートベルト」



トラクター運転時にはシートベルト装着  
※昨年、全国でトラクターの転落・転倒事故が多発しました。

★富山市農協 HP で営農情報の提供を行っています★  
<http://www.ja-toyamashi.or.jp/jouhou/> こちらで検索！

JA 富山市 営農情報

検索