

「富富富」情報(第2号)

令和5年4月

J A 富山市『富富富』ブランド化推進協議会

目標穂数の確保と過剰籾数を防止し、高品質で美味しい「富富富」を生産しましょう！



1 基肥の適正な施用

- ・ 基肥施用量は、**窒素成分でコシヒカリの2割減を基本**としてください。
- ・ 転作跡田で作付する場合は、分施栽培とし、基肥量は、表1と同量～3割減肥としてください。

表1 施肥の目安

土壌条件	肥効調節型基肥		分施	
	肥料名	施肥量 (kg/10a)	肥料名	施肥量 (kg/10a)
砂質浅耕土	富富富専用	28	基肥 206	28
砂壤土		24		24
壤土		20		20

※コシヒカリの収量レベル 540kg/10a の2割減での目安

2 適切な田植作業の実施

- ・ **田植は5月15日を中心(5月2半旬～4半旬)**に行い、安定した食味や収量を確保しましょう。
- ・ **栽植密度 70 株/坪以上、植付本数3～4本/株、植付深さ3cm**となるよう田植機を調整しましょう。
- ・ 苗箱施薬剤の使用にあたっては、登録内容を遵守するとともに、**必ず成分数を確認**しましょう。

3 初期の水管理と雑草防除の徹底

- ・ **田植後3日間程度はやや深水**にして活着を促進し、**活着後は浅水管理**により水温の上昇に努め、分けつの発生を促進しましょう。
- ・ **除草剤の散布後5日間は湛水状態、散布後7日間は止水管理**としましょう。
- ・ 除草剤の使用にあたっては、登録内容を遵守するとともに、**必ず成分数を確認**しましょう(表2)。

表2 雑草防除体系例

区分	薬剤名	使用時期	使用量 (kg/10a)	対象雑草	成分数
初期剤	マーシエット1キログラム粒剤	移植後3～5日 (ノビエ1.0葉期まで)	1	水田1年生雑草・マツバイ・ホタルイ・ミズガヤツリ	1
	ピラクロン1キログラム粒剤	移植時～移植後5日 (ノビエ1.0葉期まで)	1	水田1年生雑草・マツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ヒルムシロ・オモダカ	
一発剤	エンペラー1キログラム粒剤	移植時～移植後13日 (ノビエ2.5葉期まで)	1	水田1年生雑草・マツバイ・ホタルイ・ミズガヤツリ・ウリカワ・オモダカ・クログワイ・セリ	3

※富山県農林水産部「令和5年度 農作物病害虫・雑草防除指針」より一部引用

- 『徹底しよう！農業機械の転落・転倒対策』春の農作業安全運動実施中！（3/1～5/31）
- 『守ろう農薬ラベル 確かめよう周囲の状況』富山県農薬危害防止運動実施中！（4/13～9/14）