

大麦特報 第4号

令和5年5月
富山市農業協同組合
富山農林振興センター

今年の大麦の出穂は、昨年と比べて10日程度早くなりました。
下表を参考に、成熟したほ場から計画的に収穫を進めましょう。

収穫前の注意事項

(1) カラスノエンドウ、ハマダイコンの抜き取り

- ・ 収穫前にはほ場を巡回し、カラスノエンドウ(写真1)やハマダイコン(写真2)があれば必ず抜き取り、**ほ場外で処分**しましょう。

※カラスノエンドウの種子や、ハマダイコンの種子や莢は、収穫時に混入すると調製では取り除くことができません。

(2) 被害粒の混入防止

- ・ 湿害等による生育不良の箇所では、品質低下や病害の発生が懸念されます。収穫前に確認し、赤かび病等の被害粒の発生が認められる場合は収穫及び搬入は別扱いとしましょう。

(3) 収穫前のコンバインの清掃

- ・ 異種穀粒の混入を防止するため、収穫前にコンバインの清掃を徹底しましょう。

適期収穫の実施

◎ 収穫期の目安

出穂期	4/4	4/11
収穫開始日	5/23	5/27

注) 今後、気温が平年並で推移する場合 (5/8現在)

- ・ 穂軸と茎葉が完全に黄化し、子実水分30%以下となったほ場から順次収穫を開始しましょう。
- ・ 早刈りは粒の充実が不十分で空洞粒の原因となります。また、刈遅れは収穫ロスが多くなるうえ、熟色不良となるため、穂首がすべて折れる前に収穫を終えましょう。



写真1 カラスノエンドウ



写真2 ハマダイコン

穂軸、茎葉と子実が完全に黄化したのを確認



穂軸が曲がった穂の割合がほ場全体の50%程度になったら収穫開始



春の農作業安全確認運動 3月1日～5月31日「徹底しよう！農業機械の転落・転倒対策」
春の農繁期は農作業事故が発生しやすい季節です。農場や用水路の危険箇所の把握・改善や余裕をもった作業計画など、事故を未然に防止する対策を徹底しましょう。