

「富富富」情報(第2号)



令和6年4月

JA富山市「富富富」ブランド化推進協議会

1. 基肥の適正な施用

- 基肥施用量は、窒素成分でコシヒカリの収量レベル 540kg/10a の2割減を基本としてください。
- 転作跡田で作付する場合は分施栽培とし、基肥量は、「表1」と同量～3割減肥としてください。

表1 施肥の目安

土壌条件	肥効調節型基肥		分施	
	肥料名	施肥量 (kg/10a)	肥料名	施肥量 (kg/10a)
砂質浅耕土	側条施肥 富富富専用	28～32	側条施肥 基肥206	28～32
砂壤土		24～28		24～28
壤土		20～24		20～24

2. 適切な田植作業の実施

- 安定した食味や収量を確保するため、田植は5月6日～20日(5月15日を中心)に実施しましょう。
- 栽植密度70株/坪以上、植付本数3～4本/株、植付深さ3cm となるよう、田植機を調整しましょう。
- 苗箱施薬剤使用にあたっては、登録内容を遵守するとともに、必ず成分数を確認しましょう。

3. 初期の水管理と雑草防除の徹底

- 田植後3日間程度はやや深水にして活着を促進し、活着後は浅水管理により水温の上昇に努め、分けつの発生を促進しましょう。
- 除草剤の散布後5日間は湛水状態、散布後7日間は止水管理としましょう。
- 除草剤使用にあたっては、登録内容を遵守するとともに、必ず成分数を確認しましょう(表2)。

表2 雑草防除体系の例

前作 【水稻の場合】	区分	薬剤名	使用時期	使用量 (kg/10a)	対象雑草	成分数
富富富 以外の 品種 (初期剤+一発剤)	初期剤	マーシェット 1キロ粒剤	移植後3～5日 (ノビエ 1.0 葉期まで)	1	水田一年生雑草・マツバイ・ホタルイ・ミズガヤツリ	1
	一発剤	ビクトリーZ 1キロ粒剤	初期剤散布後 7～10日後 (ノビエ 2.5 葉期まで)	1	水田一年生雑草・マツバイ・ホタルイ・ミズガヤツリ・ウリカワ・オモダカ・クログワイ・セリ	2
富富富	一発剤	エンペラー 1キロ粒剤	移植時～移植後 13日 (ノビエ 2.5 葉期まで)	1	水田一年生雑草・マツバイ・ホタルイ・ミズガヤツリ・ウリカワ・オモダカ・クログワイ・セリ	3

※富山県農林水産部「令和6年度 農作物病害虫・雑草防除指針」より一部引用

- 『農作業事故ゼロを目指して事故防止対策を徹底しましょう』春の農作業安全運動実施中!(3/1～5/31)
- 『守ろう農薬ラベル 確かめよう周囲の状況』富山県農薬危害防止運動実施中!(4/1～9/30)