

水稻営農技術情報（第2号）～JA 富山市米品質向上生産運動展開中～

目指せ！うるち玄米1等米比率90%以上！！

- 苗が軟弱徒長にならないよう、育苗ハウスの換気を徹底
- 高温登熟を回避するため、コシヒカリの田植えは5/15を中心に実施
- 基肥量は、土壌条件に応じて調整し、落下量を確認
- 除草効果を高めるために、除草剤は遅れずに適正量を散布




1 硬化期の育苗管理

- ・ハウス内温度は、25℃以下となるよう換気を徹底しましょう。
特に、晴天日は早朝から換気しましょう。
- ・田植えの1週間前からは、夜間もハウスを開けましょう。
- ・かん水は朝1回を原則とし、床土の乾きに応じてかん水しましょう。

【育苗期間中の温度管理の目安】

ステージ	出芽期	緑化期	硬化期
育苗日数	3日	2～3日	13～15日
温度	昼	25℃以下	
	夜	10℃以上	

日射があれば搬出直後から換気の徹底を！



2 本田準備

- ・田面に高低差があると、①田植機の植付精度が低下する、②除草剤の効果が劣る、③水管理がスムーズに行えない、等の問題が生じます。耕起・代かきは丁寧に行い、ほ場の均平に努めましょう。
- ・ヒエ等の雑草の発生を抑えるために、代かきは、田植予定日の3～5日前に実施しましょう。
- ・代かきは少なめの水で行い、稲わらや雑草等をすき込みましょう。また、代かき後は自然減水とし、濁り水をほ場外に流さないようにしましょう。

3 田植え

★栽植密度70株/坪、植付本数3～4本、植付深さ3cm程度となるように田植機を調整しましょう。
栽植密度をしっかりと確保することで、穂数が確保しやすくなり、収量・品質が安定します。

【基肥量】

- ・基肥量は、土壌に応じた施肥基準を遵守しましょう。
- ・田植時は落下量を確認し、必要に応じて開度を調整しましょう。

<肥効調節型（一発）>

品種名	肥料名	基肥量(kg/10a)		
		砂質浅耕土	砂壤土	壤土
コシヒカリ	Jコートコシヒカリ1号	35	30	25
	けい酸加里入り Jコートコシヒカリ1号	45	40	35
てんたかく81	エコ早生専用	45	43	40
てんこもり	BBLPss 晩生専用	45	43	40
ゆうだい21	ゆうだい21専用	40	35	30

<分 施>

品種名	肥料名	基肥量(kg/10a)		
		砂質浅耕田	砂壤土乾田	壤土乾田
コシヒカリ	基肥 206	35	30	25
てんたかく81		45	40	35
てんこもり		45	40	35

※全層施肥の場合は、基肥で5kg/10a増量、早期追肥（田植後7日後）を10kg/10a程度施用しましょう。

- ・ 育苗箱施薬を施用する場合は、規定量を確実に散布しましょう。

※高密度に播種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて薬剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当たりの薬量を50～100gまでの範囲で調整します

- ・ 田植直後は、**水深5cm程度のやや深水**とし、苗を保護しましょう。
- ・ 活着後は、初期生育の促進のため**水深3cm程度の浅水**とし、早朝入水・日中止水で田水温が高くなるように努めましょう。

雑草が残った場合は、中期剤または後期剤を散布

- まいったが命取り**
農作業時の安全対策をしていますか？
- 
- An illustration on a yellow background showing a yellow tractor with a red prohibition sign (a circle with a diagonal slash) over it. A person in a yellow shirt and white pants is flying through the air above the tractor. Another person in a yellow shirt and a yellow hard hat stands next to the tractor, looking up. A sun is in the upper right corner, and several exclamation marks are scattered around the scene.