

目指せ！1等米比率90%以上！～JA富山市米品質向上生産運動展開中～

コシヒカリの調査ほの出穂期は8月2日頃で、
成熟期は平年より2日程度遅いと見込まれます。
今年はお穂期以降、高温で推移しています。お穂の
黄化状況を確認し、適期の収穫で立毛中の割れ
を防ぎましょう。
また、適切な乾燥・調製により、割れ米等による
品質低下を防ぎましょう。

表 コシヒカリの生育期（JA 富山市管内7ほ場平均）

年度	田植時期	出穂期	成熟期
R7	5/16	8/2	(9/9)
R6	5/16	8/3	9/10
平年	5/13	7/31	9/7

※成熟期は黄化率85%、()は予想
※平年値は H27～R6 の平均値

1 刈取りまでの管理 ～適切な水管理で、最後まで稲体活力を維持～

- (1) 収穫の5～7日前まで「間断かん水」を行い、割れ米の発生を防止しましょう。
- (2) フェーン等の高温が予想される時は、事前に入水しましょう。
- (3) クサネムの種子は、ふるいで除去できないので、確実に抜き取りましょう。

2 適期刈取 ～今年は「高温年」、黄化率80%から刈取始める！～

- (1) 今年は出穂後の気温が高温で推移し、割れ米が発生しやすい傾向がある高温年
(出穂後20日間の平均気温が28℃以上の年)です。高温年は刈遅れによる
割れ米が増加する傾向があるので黄化率80%から刈取りを始めましょう。
- (2) 枯れ上がりの早いほ場から刈取りを始め、刈取適期内に収穫を終えるよう努め
ましょう。



クサネムの種

玄米1000粒に2粒混入
すると2等米に格下げに
なります。



クサネム

表 出穂期からみたコシヒカリ刈取り始め時期の目安

出穂期	黄化率80%から 刈取始め
7/31	9/4頃
8/2	9/7頃
8/4	9/9頃

※ 高温年では、刈取適期の期間が短くなるので
注意しましょう。
※ 各地域に設置された「刈取適期表示」を目安
にして下さい。

3 乾燥調製 ～玄米水分は14.5～15.0%に仕上げましょう～

【乾燥作業の留意点】

- (1) ヤケ米の発生防止のため、刈取ったお穂は4時間以内に乾燥機に張込み、まず、常温で通風乾燥を行いましょう。
- (2) 外気温が高い場合は、送風温度を基準より5℃程度低くし、過乾燥による割れ米の発生を防ぎましょう。
- (3) 青米の混入程度を確認し、下表の目安を参考に乾燥機の停止水分を設定しましょう。
- (4) 玄米水分が17%を下回ったら、手動水分計でこまめに測定しましょう。

表 乾燥機の停止水分判定の目安 — 玄米仕上げ水分 14.5%～15.0% —

100粒中の青米数	乾燥機の設定停止水分	乾燥機停止後の水分変化
0～5粒	15.0～15.5%	乾く
6～10粒	14.5～15.0%	ほとんど変わらない
11粒以上	14.0～14.5%	もどる

【調製作業の留意点】

- (1) お摺りは、乾燥後2～3日置いて、常温まで冷まし玄米水分を均一にしてから
行い、肌ずれ米の発生を防ぎましょう。
- (2) 選別は1.9mmの篩目を使用するとともに、機種ごとの適正流量を守り、整粒歩
合を高めましょう。

刈り遅れ、過乾燥は
割れ米になるよ



嫌われる
割れ米を



絶対出さない！

富山市農協ホームページで
営農情報の提供を行っています
<http://www.ja-toyamashi.or.jp/jouhou/>
こちらで検索！

秋の農作業安全運動実施中（8月20日～10月20日）
○収穫、乾燥・調製作業中も事故防止や熱中症対策を徹底しましょう。