

湛水土中（カルパー）直播栽培特報 第4号

平成29年7月
富山市農業協同組合
富山農林振興センター

～JA富山市米品質向上生産運動展開中～

本年の幼穂形成期は平年並となっており、5月3日播種のほ場で7月16日頃と、平年より1日早くなりました。出穂期は、今後、平年並みの気温で推移すると、8月7日頃と見込まれます。

今後は、生育ステージにあわせた水管理の徹底と、生育状況に応じた追肥対応で、登熟期間の稲体活力維持に努めましょう。

表 湛水直播コシヒカリの生育状況

(7月18日現在：富山地区調査は3ヶ所平均)

年度	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉齢 (葉)	葉色
29年	83.6	516	11.9	3.9
平年(H19~28)	77.7	496	11.6	3.9

生育ステージの予想(5月3日播種)


幼穂形成期 ⇒ 7月16日

出穂期 ⇒ 8月7日頃

水管理

- 直播は根域が浅く乾燥に弱いため、出穂までは水不足にならないよう「飽水管理」を行いましょう。
- 出穂後20日間は湛水状態を保ち、その後は刈取りの5~7日前まで間断かん水を続けましょう。
- フェーン現象が予想される場合は、あらかじめ湛水しておきましょう。

<水管理のイメージ図>



出穂前の葉色確認・追加穗肥

- 必ず出穂7~10日前頃に葉色の確認を行い、葉色4.0（砂壌土では4.2）を下回る場合は、出穂3日前（走り穂が出る頃）までに追肥化成3号で7kg/10aを施用し、穂揃期の葉色を4.2~4.5（砂壌土は4.5）へ誘導しましょう。

病害虫防除

- 品質向上のため、斑点米の原因となるカメムシ類やいもち病等の防除の徹底を図りましょう。



今年も6月22日付で斑点米カメムシ類の多発注意報が発令されました。

品種：コシヒカリ

防除時期	対象病害虫	農薬名	10a当たり散布量
生育ステージ	時期の目安		
穂揃期	8/10~12頃	いもち病 ウンカ類、カメムシ類	ラブサイドキラップ 粉剤DL
傾穂期	8/17~19頃	ウンカ類、カメムシ類	スタークル粉剤DL

※ほ場の生育ステージにあわせて、適期に防除しましょう。

※カメムシ類に対する防除効果を高めるために、散布間隔は7日間を目安とし、10日以上あけないよう、計画的に実施してください。



図 主な斑点米カメムシ類
左：アヒゲホミトヨリカスミカメ
右：アカシジカスミカメ

農薬の散布は、使用基準を必ず守り、風速・風向きに注意し、周辺への飛散防止に努めましょう